

# 同意書

## ピコレーザー

▶**シミ取り放題**では、希望部位のシミにピコレーザーを照射します(医師が肝斑でない判断したシミに限り照射します)。アレキサンドライトレーザーに比べ、薄いシミにも反応します。照射後7～14日間程度赤みが出現し、腫れたり、濃くなったり、かさぶたを形成する場合があります。レーザー照射後は、反応した部位にリンデロンVG軟膏を1～2週間程度塗るようお願いいたします(ステロイドのアレルギーがある方、ご使用を控えられたい方は事前にお申し出ください)。

▶**フラクショナルレーザー**は、ピコレーザーをフラクショナル状(小さな点状)に照射します。皮膚表面を傷つけずに表皮・真皮に作用し、たるみの改善効果・ニキビ跡の凸凹や毛穴の引き締めなどに効果的です。照射当日～数日赤みが出現します。肝斑がある場合は該当部分を避けて照射します。

▶**ホワイトニングレーザー**は、顔全体のトーンアップし、ホワイトニング効果を発揮します。メラニン色素を少しずつ分解・排出していくため、薄いシミ・肌全体のくすみの改善に効果的です。肝斑がある場合は該当部分を避けて照射します。

▶**トーンアップレーザー**は、低出力のレーザーを照射することでトーンアップ効果があります。肝斑や色素沈着、くすみの改善に効果的な治療です。

レーザー照射後は日常的なスキンケアを行い、保湿を十分におこなってください。また、日焼けをしたり、肌への刺激を加えたりすると色素沈着を生じる可能性があります。治療期間中は、低刺激の日焼け止めの使用等により紫外線対策を十分に行ったうえで、日焼けは避けてください。

※ 日焼けの状態によってはレーザー照射を延期する場合がございますのでご了承ください。

※ 肌へのマッサージやピーリング等は避けてください。

治療効果や治療回数には個人差があり、治療完了後に再発することもあります。予めご了承ください。

次回の治療の際には、指示した施術間隔を守っていただくようお願いいたします。

レーザー照射後に赤み、腫れ、毛囊炎、水泡などのやけど、炎症後色素沈着、色素脱失、硬毛化などを起こす場合があります。他院でレーザーを受けられて、上記のような症状が出たことがある方は事前にお申し出ください。炎症後色素沈着は、場合によってはもとのシミより濃くなる場合があります。3～6ヶ月程度かけて徐々に改善してくることが多いですが、稀に残ってしまう場合もあります。扁平母斑など疾患によっては、もとの状態より濃くなったり、再発したりすることもあります。

照射後、皮膚トラブルが生じた場合診察させていただきますので受診をお願いいたします。

※ 診察は診療代がかかります。薬が処方される場合別途薬代がかかりますのでご了承ください。

残しておきたいホクロがある場合は施術前に看護師にお申し出ください。

下記に該当する方、既往歴・現病歴、現在内服中のお薬があれば、必ず事前にお申し出をお願いいたします。

● 禁忌：リウマチ治療にて金製剤による治療歴がある方、過度な日焼けをされている方、光アレルギーの方、妊娠中の方、尋常性白斑の方、てんかん・癌・感染症を持病にお持ちの方、金の糸が入っている方、治療部位に傷や皮膚腫瘍がある方、ペースメーカーや除細動器を入れている方、金属やシリコンがある方は治療が受けできません。

● 要相談：日焼けをされた方(スキントーンが暗い方)、お肌の乾燥が強い方、ケロイド体質の方、単純ヘルペスの活動病変がある方、心臓疾患のある方、出血性疾患のある方、糖尿病の方、授乳中の方、リウマチの既往歴がある方は治療が受けられない場合があります。

※ 授乳中の方はトラブルが起きた際に内服薬を使用することができないため、出力を上げられない場合がございます。

※ レーザーや医療機器はいずれも精密機器です。万が一、機器にトラブルがあった際には、同日に治療を受けていただけないことがありますのでご了承ください。

※ 施術ご案内用紙の内容も併せてご参照いただき、施術後の注意事項の厳守をよろしくをお願いいたします。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○ 本人 (18歳未満の場合は、法定代理人欄の両方にご署名が必要です)

令和 年 月 日 氏名

○ 法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

令和 年 月 日 氏名

(続柄 )